

ときわ交配

アツカン434

節成り性で果実肥大早く初期より**圧巻**の収量性!
果長果形の安定性にも優れる

適作型

9月～2月まき、2月～3月まき（寒冷地）

特 性

- ウドンコ病、かっぱん病に強く、べと病にも比較的強いため、薬剤散布が軽減でき、栽培後半まで安定した栽培が行える。
- 草勢は中強、側枝は安定して発生する。
- 果実肥大は早く、初期から多収となる。また春先からの高温、乾燥下においても順調に果実肥大し、尻細果の発生は少なく、短形果になりにくい。
- 主枝雌花率は、12月播種で90～100%、各節2～1果成りで節成り性が極めて高く2果成りが多いため多収となる。
- 果実は21～23cmで、果色は極濃緑、果揃い良く秀品率高い。また果やけの発生も少なく安心して栽培できる。
- 葉は極濃緑で中葉、側枝節間は詰まりにくく受光態勢の良い草姿となり、管理作業が行いやすい。

栽培の ポイント

- 台木は、ぞっこん、ときわGT-IIが適する。
- 節成り性が極めて高いため、主枝の着果節位は10節目以降とする。
- 灌水、追肥は早めのタイミングで行う。
- 低温肥大があるため、加温栽培では収穫期の最低夜温は13～14℃で順調に果実肥大させる。

“作る”を感動に変える、おいしさを届けて60年。

株式会社 **ときわ研究場**

URL <https://tokiwa-cucumber.com/>

本社 〒355-0167 埼玉県比企郡吉見町田甲1087

TEL.0493-54-1155 FAX.0493-54-1332

□ 東北営業所 岩手県北上市 TEL.0197-68-2840 □ 福島営業所 福島県須賀川市 TEL.0248-75-1594
□ 宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町 TEL.0985-73-3437