

ときわ
交配

光のひずく

適作型

トンネル・雨よけ・前進～抑制露地
3月上旬～8月中旬まき

スッキリした草姿

前期から多収穫! 草樹も長持ち!!

耐病性

ウドンコ病・ベト病やウィルス病(ZYMV)等
各種病害に耐病性を示す。

雌花着生

主枝着果率は3～4
月まきで50～60%、
5～6月まきで30～
40%、7月～8月ま
きで20～30%、主
枝・側枝とも1果成り
が中心となる。



収量性

果実肥大力に優れ、初期
より多収となり、また果
形の安定力にも優れる。
果形の乱れ少なく収量
性・草勢が安定しており、
長期にわたり秀品果が成
り続ける。

草姿

葉柄が立ち、節間は
間伸びすることなく、
スッキリした草姿で採光
性が良い。葉は濃緑で
厚みのある小葉で、持
ちが良い。

果実

果重100gで果長21cm
前後となり、円筒形の鮮
緑色で光沢のある果実。
果揃いよく、選果作業が
容易となる。

“作る”を感動に変える、おいしさを届けて60年。

株式会社 **ときわ研究場**

URL <http://tokiwa-cucumber.com/>

本社 〒355-0167 埼玉県比企郡吉見町田甲1087
TEL.0493-54-1155 FAX.0493-54-1332

□東北営業所 岩手県北上市 TEL.0197-68-2840 □中部営業所 長野県上田市武石 TEL.0268-85-3560
□福島営業所 福島県須賀川市 TEL.0248-75-1594 □宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町 TEL.0985-73-3437