

ときわ交配

クラーゴユ2

褐斑病・ウドンコ病に強い! 最後までバテ知らず上物が多い

栽培のポイント

- 台木は、ぞっこん、ときわGT-IIが適する。
- 果実肥大が早いので、灌水は多めにおこない、追肥は遅れないようにする。

適作型

ハウス栽培 3月～8月まき（無加温）

特性

■雌花着性

当社育苗による主枝雌花率は、4月まきで50～70%、8月まきで30～50%、各節1果成りが主体となる。

■耐病性

褐斑病、うどんこ病に強く、べと病にも比較的強いため、薬剤散布が軽減でき、栽培後半まで安定した栽培が行える。

■草勢

草勢は中、側枝、孫枝とも安定して発生する。葉は濃緑で中葉、受光態勢の良い草姿となり、管理作業が行いやすい。

■収量性

果実肥大は非常に早く、初期から多収となり、樹ボケの心配は少ない。また高温下においても順調に果実肥大し、尻細果の発生は少ない。

■果実

果長は22～23cm、果色は濃緑、肩こけ少なく果長の変化が少ない。

“作る”を感動に変える、おいしさを届けて60年。

株式会社 **ときわ研究場**

URL <http://tokiwa-cucumber.com/>

本社 〒355-0167 埼玉県比企郡吉見町田甲1087

TEL.0493-54-1155 FAX.0493-54-1332

□ 東北営業所 岩手県北上市 TEL.0197-68-2840 □ 中部営業所 長野県上田市武石 TEL.0268-85-3560
□ 福島営業所 福島県須賀川市 TEL.0248-75-1594 □ 宮崎営業所 宮崎県宮崎市佐土原町 TEL.0985-73-3437